

Schweden.

- Göteborg Herr Dr. A. W. Malm, Intendant vid Göteborgs Naturhist. Museum.
Örebro „ Dr. C. Hartmann.
Konneby „ Dr. C. Ag. Westerlund.

America.


- New-Bedford U. St. Mass „ John. H. Thomson, Box 440, Postoffice.
New-Cöln U. St. „ P. Th. A. Bruhin, verm. Herrn Buchhändler F. Schulthess in Zürich.
Rio Janeiro „ Dr. H. Nägely.
Cordoba, Republica „ Dr. Adolf Döring, Laboratorio quimico de la Universidad de Cordoba.*
Argentina

Australien.

- Sydney New-South-Wales „ Chevalier Gerard Krefft, Curator and Secretary of the Museum.
„ „ „ Dr. James C. Cox, Philipp Street.

China.

- Peking „ Dr. O. v. Möllendorf, deutsche Gesandtschaft; Paquete durch d. Buchhandl. von H. Tzschaschel in Görlitz, Schlesien.

 Man bittet um schleunigste Berichtigung etwaiger Irrthümer.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozöologie.

Drei neue Meeres-Conchylien der norwegischen Fauna.

Vorläufige Mittheilung aus dem conchyliologischen Bericht über die Nordseefahrt der „*Pommerania*“ im Sommer 1872

von

W. Dunker und A. Metzger.

Laiochochlis Pommeraniae nov. gen. et spec.

Testa sinistrorsa, acuminato-turrita, unicolor alba, tenuicula, subpellucens, anfractibus XII aequaliter convexis, transversim costatis et liratis, sutura profunda divisim instructa; anfractus embryonales per longitudinem plicati; apertura subrhombea a canaliculo brevi lato et aperto paullulum torto terminata; columella laevis subrecta; labrum internum leviter sulcatum. Long. 22, diam. max. 7 mill.

Tritonofusus (Fusus) Moebii nov. spec.

Testa subovato-fusiformis, undique lactea, epidermide setigera pallide olivacea obducta; anfractus 8 tumidi rotundati, embryonales obtusi, bene aequaliterque spirati, sutura valde incisa subscalati, transversim tenuiterque costulati, lineis incrementi subtilibus undulatis clathrati, ultimus spira satis longior; apertura ovata; columella sinuata; rostrum breve perparum resupinatum; canalis latissimus. — Long. 54, diam. max. 30 mill.

Lathyrus albellus nov. spec.

Testa fusiformis cinerea vel albida, anfractibus senis-septenis modice convexis sutura distincta divisis, per longitudinem plicato-costatis transversimque aequaliter striatis instructa; anfractus ultimus spira paullo longior, anfractus embryonalis submamillatus oblique tortus; apertura oblonga; labrum internum laevigatum; columella torta obsoleteque buplicata; canalis apertus subcurvus. — Long. 18, diam. max. 7½ mill.

Verzeichniss der auf meiner Reise nach dem Rothen Meere in
Europa aufgegriffenen Mollusken.

a. *Krain, Bahnstation Eisenbrück,*

während eines viertelstündigen Aufenthaltes:

Limax (Agriolimax) agrestis L. 2 Exemplare.

Helix (Trichia) Bielzii Ad. Schm.

Helix (Tachea) austriaca Mühlf.

Pupa (Torquilla) frumentum Drap.

Clausilia commutata Rossm.

Clausilia itala G. v. Mart.

Pomatias septemspirale Razoum.

Cyclostoma elegans Müll.

b. *Italien, Triest, Campagna Goseletti.*

Testacella sp. ? juv.

Ich fand nur ein kleines Exemplar in Gesellschaft von *Amalia marginata* unter faulendem Holzwerk. Das lebende